

Algebraische Geometrie I
Blatt 7

Abgabe: 4. Dezember

Aufgabe 1.

Sei p eine Primzahl. Für einen Ring A sagen wir das A Charakteristik p hat falls $p \cdot 1_A = 0$ gilt. Wir schreiben $i: \text{Spec}(\mathbb{F}_p) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ für die kanonische Abbildung.

Sei X ein Schema. Zeige, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

- (i) Für jede offene Teilmenge $U \subseteq X$ hat der Ring $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ Charakteristik p .
- (ii) Der Ring $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ hat Charakteristik p .
- (iii) Die kanonische Abbildung $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ faktorisiert über i .

Sind diese Aussagen auch äquivalent zu:

- (iv) Für alle $x \in X$ hat der Körper $k(x)$ Charakteristik p ?

Aufgabe 2.

Sei X ein Schema, setze $A := \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Sei $f \in A$ und sei

$$X_f := \{x \in X \mid f_x \notin \mathfrak{m}_x\}.$$

Zeige:

- (i) Sei $U = \text{Spec} B \subseteq X$ ein affines offenes Unterschema, und sei $\bar{f} \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ das Bild von f unter der Einschränkungabbildung $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$. Dann gilt $U \cap X_f = D(\bar{f})$. SchlieÙe daraus das $X_f \subseteq X$ eine offene Teilmenge ist.
- (ii) Angenommen, X ist quasi-kompakt. Sei $a \in A$ mit sodass $\bar{a} = 0 \in \Gamma(X_f, \mathcal{O}_{X_f})$. Zeige, dass es dann ein $n > 0$ gibt mit $f^n a = 0$ in A .
- (iii) Angenommen, der X zugrunde liegende topologische Raum ist noethersch. Sei $b \in \Gamma(X_f, \mathcal{O}_{X_f})$. Zeige, dass es dann ein $n > 0$ gibt sodass $f^n b$ im Bild der Abbildung $A \rightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{O}_{X_f})$ liegt. SchlieÙe daraus, dass $\Gamma(X_f, \mathcal{O}_{X_f}) = A_f$ gilt.

Aufgabe 3.

Sei k ein algebraisch abgeschlossener Körper und $\mathbb{P}^1(k)$ die projektive Gerade (aufgefasst als Varietät). Zeige, dass $\dim \mathbb{P}^1(k) = 1$.

Aufgabe 4.

Diese Aufgabe baut auf Aufgabe 1 des letzten Blatts auf.

Sei (X, \mathcal{O}_X) ein k -Schema¹ und $x \in X$ ein Punkt. Sei $k(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, und betrachte

$$T_x := \text{Hom}_{k(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, k(x)).$$

Sei $k[\varepsilon] = k[t]/t^2$.

- (i) Zeige, dass das Datum eines Morphisms von k -Schemata $\text{Spec}(k[\varepsilon]) \rightarrow X$ äquivalent ist zu dem Datum eines Paares (x, v) mit $x \in X$ ein k -rationaler Punkt (d.h. $k(x) = k$) und $v \in T_x$.
- (ii) Berechne T_0 für \mathbb{A}_k^n und für $\text{Spec}(k[x, y]/(y^2 + x^3))$.

¹d.h. wir fixieren auch eine Abbildung $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ für k ein Körper